INFORMATIVO CENTRO DE POMÁCEAS

UNIDADES DE FRÍO - N° 2. MAYO 2007

En todas las localidades la acumulación de frío considerando Horas con T° < 7 °C fue mayor durante este año con respecto al año pasado y a la media de los últimos 3 años. Lo mismo ocurre, pero en menor medida, y con las excepciones de Chillán y Angol, al calcular con Unidades de frío Richardson.
La lluvia caída durante el mes fue menor respecto a Mayo 2006 y al promedio de precipitaciones de los últimos 3 años, en algunas zonas tan sólo alcanzando alrededor de un 15 % de éste.

Localidad	Horas T° < 7 °C					
	2004	2005	2006	Media[1]	2007	%[2]
Graneros	350	-	224	287	359	125
San Fernando	272	161	192	208	288	138
Los Niches	334	235	270	280	369	132
San Clemente	284	211	184	226	315	139
Colbún	337	224	252	271	342	126
Chillán	-	-	320	320	354	111
Angol	214	251	203	223	259	116
Temuco	272	216	247	245	294	120

Localidad	Unidades Richardson (Utah)					
	2004	2005	2006	Media	2007	%
Graneros	360	-	234	297	304	102
San Fernando	315	354	304	324	431	133
Los Niches	427	413	364	401	418	104
San Clemente	443	411	398	417	445	107
Colbún	398	307	345	350	459	131
Chillán	-	-	421	421	417	99
Angol	430	508	391	443	335	76
Temuco	448	507	483	479	502	105

Localidad	Precipitaciones					
	2004	2005	2006	Media	2007	%
Graneros	25,2		30,9	28	17,3	62
San Fernando	28,8	262,8	54,2	115	19,0	16
Los Niches	20,2	272,6	37,6	110	22,0	20
San Clemente	19,6	203,6	60,8	95	15,1	16
Colbún	-	-	-	-	16,0	-
Chillán	-	-	17,8	-	45,2	-
Angol	19,4	411,4	165,0	199	57,8	29
Temuco	29,6	133,0	103,6	89	57,2	64

1: Media de los años 2004, 2005 y 2006
2: Porcentaje= (2007/Media)*100

Laboratorio de Ecofisiología
Centro de Pomáceas
Universidad de Talca